

误诊 100例

阴道横膈误诊为子宫肿瘤 致子宫切除 终生未孕

【典型病例】 谢女士今年52岁,14岁时因腹痛、盆腔包块考虑子宫肿瘤行“子宫切除术”,终身未孕。前不久她因腹痛及肛门坠胀再次去医院检查,发现盆腔巨大包块,考虑盆腔良性病变——囊腺瘤。

入院后,经过医生详细询问病史、妇科检查发现,谢女士阴道前后壁分别长3-4厘米左右,而正常女性阴道前、后壁长度应分别约7-9和10-12厘米,较正常人明显缩短,且于阴道顶端可触及一包块。结合手术中所见及术后病理切片检查最终确诊为阴道横膈,而盆腔巨大包块为阴道上段扩张、积液改变所致。

【为什么会误诊】 阴道横膈可位于阴道内任何部位,但以中、上段多见,厚度约1厘米左右。完全性横膈较少见,多数横膈中央或侧方有一小孔,月经血可自小孔排出,亦可正常受孕,但会影响胎儿娩出。横膈位于上段者不影响性生活,位置较低者少见,多因性生活不满意而就医。治疗上一般将横膈切开并切除多余部分即可,术后短期内放置模具防止挛缩。

该患者为临床上罕见的中下段阴道横膈,且横膈无孔,进入青春期后,月经来潮,经血无法排出集聚于阴道上段及宫腔,从而引起腹痛、肛门坠胀及盆腔包块。随着月经次数增多,症状逐渐加重。由于患者横膈离阴道口有一段距离,经血淤积于阴道中上段,如果不做阴道检查很难发现,而患者就

诊时年仅14岁,外阴及阴道口、处女膜外观无异常,因担心损伤处女膜,医生一般不会去做妇科双合诊或阴道检查,导致误诊为子宫肿瘤,而行子宫切除术。

因患者仍有一定长度的阴道存在,故婚后能勉强进行性生活;虽子宫切除后无月经,但阴道壁仍有部分分泌功能,而分泌物主要聚集于阴道上段,久而久之便再次形成包块。如果不是因为肛门坠胀、大便困难再次就诊,患者可能永远也不会知道罪魁祸首是阴道横膈。

【诊断依据】 阴道横膈是指在胚胎期由泌尿生殖窦——阴道球向头端增生、增长演变而成的阴道板,自下而上腔道化时受阻,阴道横膈未贯通或未完全腔化所致。诊断阴道横膈主要根据临床

症状、妇科检查和影像学检查。

1、症状:阴道横膈无孔者,进入青春期后无月经初潮并出现周期性下腹痛;孔小者可出现经血排流不畅的症状;横膈位于阴道中下段者可影响性生活。

2、妇科检查:检查时首先观察横膈所在部位,再检查横膈上、下有无小孔。有孔者可用宫腔探针插入孔内,探查小孔上方的阴道腔的宽度和深度,无孔者可用粗针穿刺,注意抽出积血时穿入的深度,以估计隔膜厚度,再用探针由穿刺孔插入隔膜上方阴道腔的宽度及深度,以明确诊断。

3、影像学检查:B超、CT等可提示宫腔、阴道内积液或盆腔是否有包块形成。

长沙市中心医院妇产科
主治医师 肖谈如

张医生信箱

为什么1型糖尿病 必须用胰岛素治疗?

张医生:

我今年21岁,半年前开始明显出现多饮、多尿、消瘦等症状,前段时间到医院检查,被确诊为1型糖尿病,医生建议我注射胰岛素。请问,其他的糖尿病患者都是先从吃降糖药开始,我为什么一开始就要注射胰岛素呢?

湖南读者 姜同学

姜同学:

这是因为你的糖尿病类型和“其他人”不一样,他们是2型糖尿病,而你的是1型糖尿病。

1型糖尿病又称为胰岛素依赖性糖尿病,主要是因为胰岛B细胞被破坏,体内胰岛素绝对缺乏引起,多见于儿童和青少年,往往起病较急。而2型糖尿病患者体内的胰岛素分泌往往正常或稍有不足,主要是以胰岛素抵抗为主,是胰岛素相对不足引起,多发生在40岁以上的中老年人,往往起病较慢,占所有糖尿病的90%以上。

由于两者的发病机制不同,故治疗方法也有所不同。1型糖尿病是由于胰岛素绝对不足引起,故必须注射胰岛素才能起到治疗效果。而2型糖尿病患者体内的胰岛素往往是正常的,故通过合理的饮食控制和适当的口服降糖药治疗,一般可获得满意的效果。当然,当口服降糖药治疗失败、胰岛B细胞功能趋于衰竭或出现严重的急、慢性并发症时,也是胰岛素的适应症。

张医生

如果您有任何疑问或有要咨询的问题,请联系本版责任编辑。
邮箱:57042518@qq.com
电话:0731-84326251

健康卡通



西红柿 是抗癌蔬果首选

研究发现,人体中番茄红素的血浆浓度高低与某些癌症的发生风险存在着非常密切的联系,而西红柿中的番茄红素含量较高,是比较理想的抗癌蔬果,且越红的西红柿,番茄红素含量越高。

图/文 李明新

高血脂人群 警惕脂源性胰腺炎

何女士42岁,体型偏胖,上周末与家人一起聚餐时突感腹部剧痛,伴呕吐、畏寒,被家人紧急送往医院。经检查发现何女士患上了急性胰腺炎,且血脂超出正常值数倍。医生提醒,血脂偏高者比常人更易诱发急性胰腺炎,更应避免暴饮暴食等不良饮食习惯。

胰腺是人体第二大腺体,可分泌胰液和胰岛素,具有消化蛋白质、脂肪、糖的作用。根据胰

腺炎诱发因素不同,一般可分为胆源性和脂源性两种,前者多患有胆囊炎或胆囊结石等胆道疾病;而后者多体型偏胖、血脂较高,暴饮暴食、大量饮酒为常见的诱因,如果不去除病因,可反复发作演变为慢性胰腺炎,使治疗难度加大。

因此,血脂偏高者一定要长期坚持低盐、低脂、清淡饮食,日常多食用粗粮、蔬菜、水果、高纤维饮食,少饮酒及油炸食品、

动物内脏、肥肉等,避免暴饮暴食;适当锻炼,可根据自身情况选择步行、慢跑等,注意劳逸结合;也可在医生的指导下适当服用降血脂药物,且定期到医院复查血常规、血脂、肝肾功能等指标;如果出现恶心、呕吐、腹痛、腹胀等不适时,及时到正规医院就诊,不要在家“硬抗”,更不要再勉强喝酒应酬。

长沙市第一医院副主任药师
刘晓慧

助听器来电申领



近日,由全国中老年助听协会联合爱心企业在全国举行“关爱老人,心连心,重回有声世界”暨“声仕达智能助听器领取活动”。原价2680元的助听器,现在仅需399元领取!此次活动特供1000台,申领电话4000-986-186,【申领时间:8:30-18:00】。

据活动组负责人介绍:目前,我国中老年人中存在听力障碍者约占老年人口的半数以上,听力障碍给他们的生活带来诸多不便。本次活动就是要帮助这些听力障碍、听

力严重下降人群重新恢复听力,恢复正常人的生活。

本次申领的声仕达智能助听器采用德国全进口数字电脑芯片,声音清晰柔和,体积小。严格按照人体耳廓工程力学原理设计,具有防噪声、防啸叫、大功率BET、噪音小、戴上不难受等优点。

【郑重提示】:

此次活动仅限于听力下降人群:如:1、与别人正常交流有困难人群;2、看电视、听收音机、接听电话需大声量才能听清人群;3、残疾人、低保户、教师、军烈属、听力障碍者可优先领取。

【特别声明】:

本次申领活动领取的助听器由

深圳中德无偿提供赞助,但与此相关产品的专利使用费、税费及物流、仓储、人工等基本费用由消费者自行承担,费用合计仅需399元,除此之外不再收取任何费用,请广大消费者谨记!如遇额外收费等情况,请及时拨打010-57203632举报投诉!

【活动内容】:

一、拨打电话4000-986-186登记报名申领,【申领时间:8:30-18:00】根据报名先后顺序登记先到先得,领完为止。

二、为让更多的听力下降患者带来有声世界,所以每位申请者仅限申领一台,重复申领无效!

申领代码:161