

不吃早饭小心胆囊病

现在很多年轻的上... 胆囊癌患者中很大一部分伴有胆囊结石。

据湘雅医院普外科... 胆囊癌是胆道系统中发生率较高的一种癌症。

哪些人是胆囊癌高发人群呢? 一是石灰质的人... 胆囊有息肉改变应高度考虑胆囊癌。

专家支招:

规律饮食、吃好早餐对预防胆囊息肉和结石极其重要。人体内肝脏分泌胆汁...

当然,对有胆囊结石和息肉的患者也不要因为一味地怕转癌而切除胆囊...

专家答疑

自5月14日本报刊出读者调查问卷后,收到不少读者来信,提出了许多宝贵意见和建议。

如何治疗自发性气胸

贵报曾介绍了自发性气胸这种病,对这病分析极好,可没有介绍如何治疗,真令人遗憾。

——湖南慈利县读者 吴明仁

正确的治疗可以使自发性气胸患者少受痛苦,治疗彻底;不彻底的治疗会给患者,特别是青年学生留下严重的心理负担。

●卧床休息观察:适于肺压缩少于5%—10%的患者,但只有少数人能够自愈,多数人的病情将会继续发展。

●胸腔穿刺抽气:适于肺压缩少于30%或局限性气胸的患者。如果穿刺抽气几次后,肺仍然不能很好复张,则要改换其它治疗方法。

●胸腔闭式引流:适于肺压缩大于30%或有胸腔积液的患者。对于任何类型的气胸,这都是有效的治疗手段。

段,可以明显的缓解症状。但仍然有一部分会复发,或漏气的部位不能闭合,以致于胸腔闭式引流管迟迟不能拔掉。

●胸腔镜手术:手术创伤小是其最大的优点,目前绝大多数患者采用这一方法治疗。

●普通开胸手术:方法已是落后,但治疗较彻底,术后极少复发。但体表留下较大的手术刀疤(刀口大约20—30厘米)且手术创伤大、术后恢复慢是其缺点。

●腋下小切口开胸手术

术:介于胸腔镜和普通开胸手术之间的方法,符合国际发展潮流。它吸收了前两者的优点,具有手术安全快捷,创伤轻,治疗彻底,适于各种年龄、各种类型气胸患者的特点。

在以上几种方法中,胸腔镜和腋下小切口的方法具有可以恢复身体健康和保持体表美观的双重效果。

山东省胸科医院 副主任医师 王传庆



相关链接

十种自发性气胸适合胸腔镜手术

- 1、血气胸; 2、2次发作以上的反复多次发作; 3、本次气胸发作,而另一侧曾经发生过气胸者; 4、具有双侧气胸倾向者,如双侧有肺大泡(双侧气胸可危及生命); 5、巨大肺大泡,压迫周围正常肺组织,严重影响心肺功能; 6、体育爱好者、体力劳动者、经常出差或户外工作者,如渔民、飞行员、推销员等特殊职业者; 7、胸腔插管闭式引流术后,仍然持续漏气;或引流时间过长,胸水颜色渐变混浊,血象升高,有胸腔感染迹象; 8、各级、各类学生(大、中、小学,研究生等); 9、经保守治疗后,肺复张不满意,或存在明显的胸膜异位粘连,局限性包裹; 10、女性气胸,可疑存在子宫内膜异位症。

北京大学第三医院 主任医师 闫天生

单纯疱疹病毒性睑皮炎是由单纯性疱疹病毒所引起的眼部炎症。病毒通常存在于人体内,当感冒、高热或身体抵抗力降低时,趋于活跃。

单纯疱疹病毒性睑皮炎,病变可发生于上、下睑,以下睑多见,与三叉神经眶下支分布范围相符。初发时眼部皮肤出现丘疹,常成簇状出现,很快形成半透明水泡,周围有红晕。

患了单纯性疱疹病毒性睑皮炎,一定要眼部保持清洁,防止继发感染。不能揉眼,并可在结膜囊内滴用0.1%阿昔洛韦滴眼液,防止蔓延至角膜。

单纯疱疹病毒性睑皮炎如何防治

张健

驴胶补血颗粒 治疗保健两相宜

中医学认为:妇女以血为主,从生理上讲,体弱妇女多以补血之品作为保健。从病理而言,妇人之疾,无不关乎经、带、胎、产,多与阴血相关。

补血之法,有单补和双补,单补纯用补血药,因多滋腻,对脾胃素弱者就难长期服用,双补则是补气药与补血药同用,则气能生血,阳生阴长,有相得益彰的好处。

九芝堂驴胶补血颗粒并非只是单纯用于缺铁性贫血及白细胞的良药,只要辩证施用,许多妇科病都有应用的机会。笔者从事乳腺增生病专科多年,对此亦有体会。

周青

湖南博雅文化商务有限公司 独家买断 本报刊头 联系电话:0731-4313877 联系人:张小姐

苗药偏方治好精神病癫痫头痛失眠不再是梦

大脑一是指人的总指挥,与心紧紧相连,万事先由心感应,反射到大脑,再由大脑指挥使人体四肢有条不紊地工作。

药物分子能够长期连续贮存在体内,直至完全吸收。经临床应用,成功地改写了长期服用西药只能控制的历史。患者朋友们!如果你服用西药、中成药几年或十几年都不能根治时,请你立即清醒过来,改用苗药偏方治疗,能从此获得根治不易复发,改变你采用其他治疗方案终身服药的命运。

打击,导致她常常出现发呆、恐惧、喜怒无常、自言自语,总是幻觉身边有人想谋杀她或害她,甚至对家人或其他人进行谩骂或追打,给家庭和社会造成了极其不良影响。

精益求精,诚信为本,一丝不苟地为患者服务。坚持以人为本,开设自由服务模式(不实行强制性、禁闭性),其优点是(1)节约住院费用。(2)使患者能自愿开心地接受治疗。(3)不影响正常生活,治疗期间可工作、学习。